

13.5 cm.

กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ยารักษาโรคไข้มาลาเรียฟัลซิพารัม (พีเอฟ)

สถานที่ตรวจรักษา ลำดับผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย อายุ ปี

วันที่เริ่มกินยา (d0) ลงนามผู้จ่ายยา

วันที่กินยาครบ น้ำหนักผู้ป่วย กิโลกรัม

ระดับเอนไซม์ G6PD U/gHb ☐ ไม่ได้ตรวจ

ผลการตรวจ G6PD ☐ Normal ☐ Deficiency ☐ Partial Deficiency

วันที่ตรวจตามนัด/ติดตามครั้งที่ 1 (d3) ลงนาม

วันที่ติดตามครั้งที่ 2 (d7) ลงนาม

วันที่ติดตามครั้งที่ 3 (d28) ลงนาม

วันที่ติดตามครั้งที่ 4 (d42) ลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ☐ แบบรายงานติดตามผู้ป่วย ☐ สไลด์ ☐ กระดาษกรอง

10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 11 ถึงน้อยกว่า 17 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 7.5 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น


10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 17 ถึงน้อยกว่า 25 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 7.5 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น


10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 25 ถึงน้อยกว่า 36 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 15 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น


10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 36 ถึงน้อยกว่า 60 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 15 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น


10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 60 ถึงน้อยกว่า 80 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 15 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น


10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักมากกว่า 80 กิโลกรัม

วันที่ 1

กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันที



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 2



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย

วันที่ 3



ลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้ป่วย



Primaquine 15 mg.

- กินยาหลังอาหารตามจำนวนที่กำหนดให้ครบ 3 วัน
- ยาชุดนี้สำหรับรักษาผู้ป่วย 1 คนเท่านั้น
- ห้ามนำยานี้ไปให้ผู้อื่นกิน

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

10 cm.