

13.5 cm.

กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ยารักษาโรคไข้มาลาเรียไวแวกซ์ (ฟีวี), โอวาเล่ (ฟีโอ)

สถานที่ตรวจรักษา ..... ลำดับผู้ป่วย .....

ชื่อผู้ป่วย ..... อายุ ..... ปี

วันที่เริ่มกินยา (d0) ..... ลงนามผู้จ่ายยา .....

วันที่กินยาครบ ..... น้ำหนักผู้ป่วย ..... กิโลกรัม

ระดับเอนไซม์ G6PD ..... U/gHb ☐ ไม่ได้ตรวจ

ผลการตรวจ G6PD ☐ Normal ☐ Deficiency ☐ Partial Deficiency

วันที่ตรวจตามนัด/ติดตามครั้งที่ 1 (d14) ..... ลงนาม .....

วันที่ติดตามครั้งที่ 2 (d28) ..... ลงนาม .....

วันที่ติดตามครั้งที่ 3 (d60) ..... ลงนาม .....

วันที่ติดตามครั้งที่ 4 (d90) ..... ลงนาม .....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ☐ แบบรายงานติดตามผู้ป่วย ☐ สไลด์ ☐ กระดาษกรอง

10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 11 ถึงน้อยกว่า 15 กิโลกรัม  
CQ = 4 เม็ด

เริ่มกินยา

วันที่ 1



วันที่ 2



วันที่ 3



กินยาตามวัน ให้ครบ 3 วัน ตามลูกศรชี้แล้วกลับมาตามนี้



Chloroquine


ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 15 ถึงน้อยกว่า 25 กิโลกรัม

CQ = 5 เม็ด, PQ (7.5 mg) = 14 เม็ด




ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

10 cm.

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนัก 25 ถึงน้อยกว่า 50 กิโลกรัม  
CQ = 6 เม็ด, PQ (7.5 mg) = 21 เม็ด




10 cm.

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น

13.5 cm.

สำหรับผู้ป่วยน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม

CQ = 10 เม็ด, PQ (15 mg) = 14 เม็ด



10 cm.

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กก. ให้ทำการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น