

การติดตามผลการรักษา



นัดติดตามหลังการรับยาดังนี้

- วันที่ 7 ติดตามอาการไม่พึงประสงค์
- วันที่ 14 ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และเจาะเลือดตรวจเชื้อมาลาเรีย
- วันที่ 28 เจาะเลือดตรวจเชื้อมาลาเรีย
- วันที่ 60 เจาะเลือดตรวจเชื้อมาลาเรีย
- วันที่ 90 เจาะเลือดตรวจเชื้อมาลาเรีย

****โปรดมาติดตาม ตามนัดหมาย เพื่อความปลอดภัยของท่าน****
หากไม่สามารถมาได้ กรุณา โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ สพ.



****หากมีข้อสงสัย หรือ ขอคำปรึกษาเรื่องการใช้ยา****



สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
กองโรคติดต่อภายใน โดยแผนก กรมควบคุมโรค
โทร. 02-590-3102



ติดต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อ.....

เบอร์โทร.....

หรือ

ชื่อ.....

เบอร์โทร.....

วันที่นัด	วันที่ 7	วันที่ 14	วันที่ 28	วันที่ 60	วันที่ 90
วันที่ผู้ป่วยมา	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....
LAB	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....	/...../.....
อาการไม่พึงประสงค์ (กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ผู้ป่วยมีอาการ)					
คลื่นไส้ อาเจียน					
ท้องเสีย					
เวียนศีรษะ					
ผื่นคัน					
ตัวตา เหลือง					
ซีด					
ปัสสาวะสีได้ก					
ลงชื่อผู้บันทึก					

การรักษา และติดตามความปลอดภัยผู้ป่วย มาลาเรีย ไขว่แวกซ์ที่ได้รับยาทาฟิโนควิน หรือ ยาไพริมาควิน

ชื่อผู้ป่วย.....อายุ.....ปี

HN.....

ได้รับยารักษา มาลาเรียวันที่

- () 1. คลอโรควิน 3 วัน + ทาฟิโนควิน 1 วัน
- () 2. คลอโรควิน 3 วัน + ไพริมาควิน 7 วัน
- () 3. คลอโรควิน 3 วัน + ไพริมาควิน 14 วัน




สาเหตุของโรคไข้มาลาเรีย:

เกิดจากถูกยุงกัดที่มียุงตัวเมียกัด
ท่านได้รับการตรวจพบการติดเชื้อ
มาลาเรียมดไขว่แวกซ์ หรือ เชื้อฟิฟ



อาการโรคไข้มาลาเรีย :

ตัวร้อน มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ
ปวดเมื่อยตามตัว อาการจับไข้เป็นเวลา
อาจเป็นทุกวัน หรือวันเว้นวัน



การรักษา



หลังจากการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ
มาลาเรียชนิดไวเวกซ์

ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ
ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกซ์พีดี



แพทย์จะให้ยารักษามาลาเรียตามผล
ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกซ์พีดี ดังนี้



★ 1.ปกติ ไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกซ์พีดี

กาพิโนควิน 1 วัน
หรือ

คลอโรควิน 3 วัน **ร่วมกับ** ไพรมาควิน 7 วัน
หรือ
ไพรมาควิน 14 วัน

★ 2. มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกซ์พีดี

คลอโรควิน 3 วัน **ร่วมกับ** ไพรมาควิน 8 สัปดาห์

ผลข้างเคียงจากการกินยา

เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน
ควรกินยาหลังอาหารทันทีเพื่อไม่ให้ท้องว่าง

****อย่าลืมว่า****


ต้องกินยาตามที่ให้ไปให้ครบถ้วนทุกมื้อตามเวลา



อาการใดบ้างที่ท่านต้อง รับมา sw.




อ่อนเพลีย



เวียนศีรษะ




ซิด-ดูซิดไม่แข็งแรง




ตัวและตาเหลือง




หายใจลำบาก
หรือหายใจตื้นๆ




คลื่นไส้
หรืออาเจียน



มีไข้



หัวใจเต้นเร็ว




ปวดหลัง



สิ่งสำคัญที่ท่านต้อง สังเกต



**** ปัสสาวะสีเข้มขึ้น
สีเหมือนในกรอบสีแดง ****



หากพบอาการเหล่านี้
ท่านต้องรีบมา
พบแพทย์ที่ sw. ทันที

